

**PROHIBICIÓN DE USO DE MEDICAMENTOS
(ANTIALÉRGICOS PARA TEST CUTÁNEO)**

Se recomienda a los pacientes que van a someterse a la realización de una prueba cutánea, previo al consentimiento de su médico tratante, interrumpir el tratamiento con:

| AGENTE TERAPÉUTICO | DÍAS ULTIMA DOSIS |
|--|--------------------------|
| Antihistamínicos de acción corta | 2-3 días |
| Antihistamínicos de acción larga | 8 semanas |
| Hidroxicina | 2 semanas |
| Ketotifeno | 2 semanas |
| Antidepresivos tricíclicos | 2 semanas |
| Aplicaciones local de un ungüento | 2- 3 semanas |

Aplicaciones local de un ungüento 2- 3 semanas Los corticoides en dosis inferiores a 10 mg de prednisona/prednisolona no necesitan ser interrumpidos antes de la prueba cutánea.

CASA MATRIZ
RAMÓN FREIRE 406
652632768 / 652634210

CASTRO ECOSUR
SERRANO 415
65 2533773

CASTRO
ELEUTERIO RAMIREZ 580
65 2636402

ANCUD
ELEUTERIO RAMIREZ 294
65 2629970

DALCAHUE
ALFREDO AMPUERO 295
65 2642221

QUELLÓN
LADRILLEROS 640
65 2682608